

INFORMATIONS
POUR LES PARENTS

Piqure de tique



Service d'urgence Kinderspital Zürich

Consultations payantes par téléphone au 0900 266 71 1

Comment me comporter quand je découvre une ou plusieurs tiques sur mon enfant?

La/les tique(s) doit/doivent être enlevée(s) aussi rapidement que possible à l'aide d'une pincette.

La tique doit être si possible, saisie directement au dessus de la peau, tirée par l'arrière et relevée pour la sortir du canal de piqûre. Si vous n'avez pas de pincette, vous pouvez également coincer la tique entre l'ongle du pouce et celui de l'index pour la sortir. L'endroit qui a été piqué doit par la suite être désinfecté avec un produit désinfectant habituel.

Attention: en tirant la tique pour la sortir, veillez à ce qu'elle ne soit pas trop tournée. Vous ne devez également pas mettre de l'huile sur la tique! Si sa tête ou l'une de ses petites pattes reste ancré dans la peau en l'enlevant, vous ne devez pas forcément la retirer. L'essentiel c'est d'enlever son corps, surtout son système gastro-intestinal. Vous n'avez pas besoin de la conserver, car

aucune analyse de la tique n'est effectuée.

A quoi dois-je faire attention après une piqûre de tique et quand dois-je contacter un médecin?

- Si vous constatez une rougeur sans douleur à la forme d'un anneau s'élargissant lentement autour de l'endroit piqué (éventuellement également à d'autres parties du corps) 3 à 32 jours après la piqûre, consultez un médecin.
- Si la fièvre ou de forts maux de tête surviennent 7 à 14 jours après la piqûre de tique.
- Des enflures d'origine indéterminée au niveau des articulations, surtout au genou ou au pied (peuvent survenir quelques semaines ou quelques mois après une piqûre de tique).
- Une paralysie faciale (d'un seul côté du visage) peut se produire 3 à 10 semaines après une piqûre de tique.